Click to prove you're human

¿Alguna vez has mirado una pastilla de jabón y has querido darle un mordisco? No es tan infrecuente como podría pensar. Pica es un trastorno de salud mental que provoca el deseo o la compulsión de comer alimentos sin valor nutricional. Las personas con pica pueden querer comer arena, arcilla, hielo o incluso escamas de pintura. Uno de los elementos más comunes que las personas con pica a veces quieren comer es el jabón en barra. El deseo de comer jabón incluso tiene su propia clasificación, llamada sapofagia. La mayoría de los tipos de jabón corporal, champú y acondicionador no son tóxicos (incluso si no están destinados a ser comestibles). Sin embargo, comer un bocado o dos de jabón puede causar indigestión o vómitos, además de otros sintomas. Con el tiempo, comer jabón repetidamente puede provocar complicaciones de salud. Comer jabón puede tener algunos efectos secundarios dañinos. Es posible que comer una pequeña cantidad de jabón no cause un daño permanente a su cuerpo, pero realmente depende del tipo de jabón que ingiera y de la cantidad. Casi todos los jabones tienen un pH muy alcalino, según un Estudio 2019. Esto significa que comerlo puede alterar su digestión e irritar el revestimiento de su tracto digestivo. Además, los jabones disponibles en el mercado suelen contener ácidos (como ácido láurico o ácido esteárico), así como ingredientes que provienen de plantas (como aceites esenciales y fragancias). Incluso si estos ingredientes son "totalmente naturales", no son aptos para alimentos. Eso significa que comer jabón puede provocar más que una pequeña molestia, así como vómitos. Su cuerpo puede tener dificultad para digerir el jabón, lo que puede causar diarrea o incluso sangre en las heces. Comer jabón puede causar inflamación en otras partes de su cuerpo. Comer jabón puede hacer que se le hinchen la lengua, la garganta y otras partes del cuerpo. Esto puede ser una reacción temporal a los ingredientes agresivos del jabón o un síntoma de alergia. De cualquier manera, puede resultar incómodo y, en algunos casos, dificultar la respiración o la deglución. Comer jabón puede dañar su hígado Parte del trabajo de su hígado es filtrar las toxinas de su torrente sanguíneo para que esas toxinas no dañen sus órganos. Comer una gran cantidad de jabón ejerce presión sobre su hígado ya que funciona para eliminar los ingredientes no comestibles de su cuerpo. Comer jabón puede aumentar su riesgo de cáncer Algunos ingredientes del jabón están bien cuando se aplican tópicamente, pero se sabe que actúan como carcinógenos cuando se ingieren con regularidad. Cocamide DEA, por ejemplo, es una forma químicamente modificada de aceite de coco que se encontró en al menos 98 productos de champú y jabón tan recientemente como en 2013. Las causas de la sapofagia pueden variar. La pica puede ser causada por deficiencias nutricionales, como la falta de hierro o zinc en su dieta. Es también más común durante el embarazo, quizás debido a las necesidades nutricionales de su cuerpo que cambian rápidamente si está embarazada. En los adultos mayores, afecciones como el Alzheimer y la demencia pueden provocar el deseo de comer jabón. A Estudio de caso 2019 mostró que un alto porcentaje de adultos mayores que comen jabón pueden hacerlo como síntoma de demencia. Algunas personas quieren comer jabón porque es un comportamiento aprendido que se demostró en su entorno familiar o cultural. Los niños pueden comer jabón por deseo de hacer travesuras o por pura curiosidad. Pueden comer jabón porque no conocen nada mejor y quieren saber a qué sabe. Los niños también pueden desarrollar la condición pica, lo que hace que quieran comer jabón. Un estudio alemán de 2018 encontró que 12 por ciento de los niños que participaron en el estudio experimentaron pica, lo que sugiere que puede ser relativamente común en ese grupo de edad. Las deficiencias nutricionales pueden influir en la compulsión de los niños por comer jabón. Las condiciones de salud mental y el autismo pueden hacer que un niño sea más propenso a desarrollar pica. En la mayoría de los casos, la pica en los niños disminuirá a medida que el niño crece. Como anécdota, las personas con pica dicen que les gusta mucho comer jabón y les cuesta dejar el hábito. Sin embargo, comer jabón puede dañar los órganos internos a largo plazo, por lo que es importante recibir tratamiento. Estrategias de prevención Una de las primeras estrategias recomendadas puede ser limitar su exposición al tipo de jabón que usted (o su hijo) se sienta obligado a comer, según 2021 investigación. Por ejemplo, puede intentar sacar todo el jabón en barra de su casa y reemplazarlo con gel de ducha. Terapia cognitivo-conductual (TCC) Un profesional de la salud puede recomendar CBT si limitar su exposición al jabón no es suficiente para tratar la sapofagia. Este método de terapia utiliza objetivos procesables, así como estrategias de atención plena para ayudarlo a cambiar hábitos y compulsiones no deseados. Suplementos nutricionales Un médico puede realizar un análisis de sangre para determinar si una deficiencia nutricional está causando su pica. Si le falta un mineral como el zinc o el hierro, un suplemento nutricional puede quitarle el deseo de comer jabón. Es cierto que algunos jabones afirman estar hechos de ingredientes no tóxicos de grado alimenticio. A veces, el jabón se hace de esta manera para proteger a los niños pequeños curiosos a los que les gusta meterse jabón, y todo lo demás que encuentran, en la boca. El hecho de que el jabón esté hecho para no ser tóxico o "apto para uso alimentario" no significa que sea un alimento. No debes consumir ningún tipo de jabón en grandes cantidades, sin importar de qué esté hecho. Si toma un bocado de jabón porque tiene curiosidad o ha intentado probarlo una vez, es poco probable que observe efectos secundarios además de malestar estomacal o dolor de garganta. Sin embargo, si usted (o su hijo) come regularmente jabón o falto para comer jabón, es posible que desee hablar con un médico sobre este hábito. La mayoría de los niños y las personas embarazadas naturalmente dejan de sentir compulsiones por la pica, pero eso no significa que no deba decirle a su médico lo que está experimentando. Algunas personas con pica a largo plazo experimentan obstrucciones intestinales que pueden dificultar el uso del baño. Esto puede suceder con la sapofagia. Si tiene estreñimiento y ha estado comiendo jabón, debe informárselo a un médico. Emergencia médicaLlame al 911 o al Línea directa de control de intoxicaciones al 800-222-1222 inmediatamente si nota alguno de los siguientes síntomas después de comer jabón: sensación de ardor en la garganta o el esófago convulsiones mareos o pérdida del conocimiento respiración dificultosa vómitos de sangre frecuencia cardiaca irregular El deseo de comer jabón no es tan infrecuente como podría pensar. La ingestión de una pequeña cantidad de jabón no suele ser tóxica a corto plazo, pero el consumo habitual de jabón puede provocar complicaciones más adelante. Comer jabón puede ser un indicador de una deficiencia nutricional o una condición de salud mental. Hable con su médico si se siente obligado a comer jabón con regularidad. Pueden recomendarle el mejor tratamiento. Nuestro profesional de la salud respondeLo mas probable es que no le pase nada. Los productos de aseo personal estan diseñados con sustancias que no son tóxicas en cantidades bajas. Por esto no debe preocuparse un una ingesta mínima accidental. Por el en contrario debe evitarse su consumo en grandes cantidades. Igualmente si presenta sintomas como dolor abdominal, diarrea, nauseas o vomito acuda a su medico. Versión en inglés revisada por: Jesse Borke, MD, CPE, FAAEM, FACEP, Attending Physician at Kaiser Permanente, Orange County, CA. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. Versión en inglés revisada por: Jesse Borke, MD, CPE, FAAEM, FACEP, Attending Physician at Kaiser Permanente, Orange County, CA. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. Es bueno para el organismoEl jabón es un detergente que sirve para lavar nuestra ropa, para lavar trastes o para hacer la limpieza de la casa, los encuentra en polvo o en barra y con diferentes aromas, pero ¿porque hay personas que les gusta comer jabón?Estas son algunas de las razones por lo que hay gente que come jabón: ¿Hace daño comer jabón?• Porque les gusta sentir su textura, oler su aroma y probar su sabor.• Porque se les antoja probar otros cosas que no sean alimentos.• Porque tiene una adicción al jabón.• Porque alguien le enseño a comer jabón.• Porque padece una ansiedad.• Porque no está bien psicológicamente, es decir que no está al cien en sus facultades mentales.Cuando ingiere jabón expone su salud a padecer diferentes problemas, estos son algunos.Consecuencias de comer jabón:• Le causa dolor de estómago.• Le puede dar una indigestión de tanto jabón.• El jabón no es nada grato a nuestro paladar por su textura.• Puede tener un problema digestivo como estreñimiento.• Comer jabón hace daño porque a la larga los químicos que contiene el jabón le pueden perjudicar su salud. • No le aporta ningún nutriente.Por estas y más razones no debe comer por ningún motivo jabón, y si es de las personas que tiene este problema consulte a un profesional (psicólogo) para que le ayude a resolver su problema. La mejor recomendación es que solo utilice el jabón para lo que es, para los quehaceres (limpieza) de nuestro hogar y por nada lo ingiera. Versión en inglés revisada por: Jesse Borke, MD, CPE, FAAEM, FACEP, Attending Physician at Kaiser Permanente, Orange County, CA. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. Versión en inglés revisada por: Jesse Borke, MD, CPE, FAAEM, FACEP, Attending Physician at Kaiser Permanente, Orange County, CA. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. Versión en inglés revisada por: Jesse Borke, MD, CPE, FAAEM, FACEP, Attending Physician at Kaiser Permanente, Orange County, CA. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. Preguntado por: Aaron Longoria | Última actualización: 11 de diciembre de 2023 Puntuación: 4.5/5 (74 valoraciones) Si ingiere accidentalmente lavavajillas mano, este puede producir una irritación. Inmediatamente después debes beber un vaso de agua para diluir el líquido. No provoques el vómito. Puede que experimentes síntomas como estómago revuelto, diarrea y vómitos. ¿Qué pasa si como jabón de platos? Los detergentes y jabones líquidos estándar domésticos pocas veces causan lesiones graves si se ingieren accidentalmente. Sin embargo, los paquetes de detergentes de uso único para lavandería o para lavar platos, o "cápsulas" son más concentrados. Por lo tanto, tienen más probabilidades de causar daño al esófago. ¿Qué pasa si tomas un poco de fairy? Síntomas y lesiones posibles en caso de ingestión : Irritación de la mucosa oral o gastrointestinal. Náuseas. Vómitos. secreción excesiva. ¿Por qué me dan ganas de comer jabón? Las personas con síndrome de pica consumen sustancias no comestibles como tierra, gis, cabellos, pedacitos de tela, jabón y materia fecal, entre otras. Esta ingesta es persistente, compulsiva y desenfrenada, y se debe al estrés, la ansiedad, la anemia y la deficiencia de electrolitos en la sangre. ¿Qué pasa si trago un poco de shampoo? El champú se considera relativamente atóxico (no tóxico). Si se presenta una reacción alérgica, inmediatamente busque asistencia médica. Llame a su número local de emergencias (como el 911 en los Estados Unidos). Llame al centro de toxicología para solicitar más información. Masticar o comer cabello o materiales vellosos (o materiales difícilmente digeribles como bolsas plásticas) puede llevar a la formación de un bezoar. La tasa es muy baja. El riesgo es mayor entre las personas con discapacidad intelectual o niños con trastornos emocionales. Los médicos no saben exactamente cuál es la causa de la pica. Pero es más frecuente en personas con: problemas del desarrollo, como el autismo o las discapacidades intelectuales. problemas de salud mental, como el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) o la esquizofrenia. Si ingiere accidentalmente lavavajillas mano, este puede producir una irritación. Inmediatamente después debes beber un vaso de agua para diluir el líquido. No provoques el vómito. Puede que experimentes síntomas como estómago revuelto, diarrea y vómitos. Cuando tu perro come un jabón, de cualquier tipo, ha sufrido una intoxicación o envenenamiento, por lo que los síntomas que podemos apreciar serán los siguientes: Vómitos y diarreas (Podemos observar sangre en algunos casos). Lloriqueos por el dolor abdominal intenso. Hipersalivación, pudiendo observar charcos. Los jabones comercializados para el aseo cutáneo pueden incluir ingredientes químicos que dañan los queratinocitos humanos y causan irritación subclínica de la barrera cutánea. Su utilización puede agravar dermatosis preexistentes, generar dermatitis xerósica o de contacto irritativa y causar atrofia y dermatoporosis. Jabón de glicerina: tiene pH neutro; mantiene la acidez en la piel y reduce al acné y las manchas cutáneas. Jabón de caléndula: tiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas y es ideal para combatir el acné y regenera la piel más rápido que otros. Jabón de árbol de té: es hidratante, regenerador y antiséptico. La pica es un trastorno alimentario. obtenga más información que se caracteriza por comer con regularidad cosas que no son alimentos. Por lo general, lo que comen las personas con pica no les hace daño, pero, a veces, les causa complicaciones, como obstrucciones en el tubo digestivo o envenenamiento por plomo. Resumen. La pica es un síntoma, no una enfermedad, que se manifiesta por la ingesta persistente y compulsiva de sustancias no comestibles como tierra, arcilla, tiza, jabón y materia fecal, o comestibles como hielo (pagofagia), almidón (amilofagia), papa, arroz y café, entre otras, en forma compulsiva y desenfrenada. Algunos síntomas de intoxicación Los síntomas pueden incluir babeo, disfagia y dolor en la boca, el pecho o el estómago; luego pueden producirse estenosis. En casos de inhalación, puede producirse tos, sensación de ahogo, picor de garganta, en los ojos y, en ocasiones, dolor de cabeza. Entre los signos y los síntomas de la intoxicación se pueden incluir los siguientes:Quemaduras o enrojecimiento alrededor de la boca y los labios.Aliento que huele a sustancias químicas, como gasolina o solvente de pintura.Vómitos.Dificultad para respirar.Somnolencia.Confusión o estado mental alterado. Su inhalación puede causar daños severos en el sistema respiratorio, además de ardor en los ojos. Alcohol gel y Lejía. Su mezcla produce cloroformo y ácido clorhídrico, ambos muy tóxicos. Inhalar sus vapores puede producir daños en ojos, piel, pulmones, riñones, hígado y sistema nervioso. Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si te comes jabón, has venido al lugar correcto. En este artículo, exploraremos los efectos que puede tener en tu cuerpo comer jabón, así como qué hacer si tú o alguien que conoces comió jabón. También discutiremos por qué algunas personas sienten la necesidad de comer jabón y qué hacer si un niño come jabón. ¿Por qué algunas personas sienten la necesidad de comer jabón? Comer jabón es un trastorno alimentario poco común llamado pica. La pica ocurre cuando una persona tiene un deseo inusual de comer cosas que no son alimentos. Las personas con pica pueden tener un deseo de comer jabón, arcilla, papel, hielo y otros objetos no comestibles. No se sabe exactamente por qué algunas personas desarrollan pica, pero se cree que puede estar relacionado con deficiencias nutricionales, trastornos emocionales y mentales, o simplemente una curiosidad inusual. También puede ser un comportamiento aprendido, especialmente en culturas donde se utilizan sustancias no comestibles para fines medicinales o rituales. Leer Más¿Qué pasa si tomo agua con limón todos los días?Si comes jabón, lo más probable es que no te sientas muy bien. El jabón no está destinado a ser ingerido y puede causar una serie de efectos negativos en el cuerpo. En primer lugar, el jabón puede irritar la boca, la garganta y el estómago. Esto puede provocar dolor, náuseas, vómitos y diarrea. Además, algunos tipos de jabón contienen sustancias químicas peligrosas que pueden ser tóxicas si se ingieren en grandes cantidades. Por ejemplo, algunos jabones líquidos para lavar platos contienen fosfatos, que pueden ser perjudiciales para la salud si se ingieren grandes cantidades. Leer Más¿Qué pasa si tomo omega 3?En casos extremos, comer jabón puede incluso causar una obstrucción en el tracto intestinal si se ingiere en grandes cantidades. ¿Qué hacer si te comes un jabón? Si ingieres una pequeña cantidad de jabón, probablemente no necesites hacer nada. Puedes sentir un poco de malestar estomacal, pero deberías recuperarte por tu cuenta. Sin embargo, si ingieres una gran cantidad de jabón o si comienzas a sentir síntomas graves, es importante buscar atención médica de inmediato. Llama al centro de toxicología local o acude a la sala de emergencias más cercana. ¿Qué hacer si un niño come jabón? Leer Más¿Qué pasa si me pico con una aguja de diabético?Si un niño come jabón, es importante actuar rápidamente. Es posible que el niño no sepa que el jabón no es para comer y pueda seguir comiéndolo. En primer lugar, asegúrate de que el niño no tenga ninguna pieza de jabón en la boca y que no vuelva a comerlo. Luego, observa al niño para detectar cualquier síntoma de malestar estomacal. Si el niño comienza a mostrar síntomas graves, busca atención médica de inmediato. En general, es importante mantener los productos de limpieza fuera del alcance de los niños para evitar que se los coman accidentalmente. ¿Qué pasa si como lavaplatos? Al igual que con el jabón, comer lavaplatos no está destinado a ser ingerido y puede ser peligroso para la salud. Los lavaplatos contienen una serie de productos químicos que pueden ser tóxicos si se ingieren en grandes cantidades. Si comes lavaplatos, es importante buscar atención médica de inmediato. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago y dificultad para respirar. Ingesting dish soap, although it might seem harmless, can lead to a number of potential health issues. Never should one consider using it as an alternative food or drink. Síntomas comunes después de la ingestión Los efectos más comunes de ingerir jabón de platos incluyen náuseas, vómitos y diarrea. Estos son síntomas alarmantes que pueden requerir atención médica inmediatamente si son graves. También es posible experimentar dolor abdominal o una sensación de ardor en la boca y la garganta. 2. Cómo Actuar Si Has Ingerido Jabón de Platos Saber cómo actuar si has ingerido jabón de platos es crucial para mantener tu seguridad. Puede haber una serie de efectos a corto y largo plazo en tu salud a raíz de ingerir jabón de platos, por lo que obtener una rápida respuesta es vital. Desde sentirte enfermo hasta experimentar dolor en tu garganta, estas son las consecuencias comunes después de la ingesta. Síntomas de Ingesta de Jabón de Platos Una vez que hayas ingerido jabón de platos, comenzarás a notar varios síntomas que pueden variar dependiendo de la cantidad ingerida y tu salud general. Los síntomas más comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. También puedes experimentar una sensación de quemazón en tu garganta y tener dificultad para tragar. Pasos Inmediatos Post Ingesta No intentes vomitar ya que puede resultar en que el jabón regrese a tu garganta y esófago, causando más daño. En su lugar, intenta beber agua o leche para ayudar a diluir el jabón. Contacta inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o busca atención médica de urgencia. Además, conserva la botella del jabón de platos que ingeriste para que los profesionales de la salud puedan tener una idea más clara de qué sustancias habrías podido consumir. 3. Prevención: Cómo Evitar la Ingesta Accidental de Jabón de Platos La ingestión accidental de jabón de platos puede ser desagradable y peligrosa. La prevención es fundamental para evitar incidentes de esta naturaleza. Aunque los fabricantes de jabón hacen todo lo posible para hacer que estas sustancias sean seguras, es importante seguir algunas pautas para prevenir cualquier incidente. Colocar los productos de limpieza fuera del alcance Una excelente medida preventiva es colocar los productos de limpieza, incluyendo el jabón de platos, fuera del alcance de los niños y las mascotas. No es inusual que estos productos se almacenen debajo del fregadero, pero se podría considerar la idea de colocarlos en un lugar más alto y seguro. No dejar los productos de limpieza sin vigilancia Es importante no dejar los productos de limpieza desatendidos mientras se están utilizando. Si necesitas hacer una pausa mientras estás limpiando, asegúrate de sellar bien la botella del jabón de platos y colócalo en un lugar seguro antes de irte. Recuerda, la prevención siempre es mejor que la curación. Siguiendo estas simples pautas, puedes evitar la ingestión accidental de jabón de platos y mantener a tus seres queridos a salvo. ¡Haz clic para puntuar esta entrada! Versión en inglés revisada por: Jesse Borke, MD, CPE, FAAEM, FACEP, Attending Physician at Kaiser Permanente, Orange County, CA. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. A todos los niños les gusta meterse objetos en la boca; para ellos es una manera natural de conocer y explorar el mundo que los rodea. Por tal motivo, debemos ser muy cuidadosos. El cuarto de baño es uno de los lugares de la casa en el que debemos poner especial atención, pues allí guardamos muchos productos que pueden resultar tóxicos para nuestros hijos: medicamentos, pastas de dientes, champú, jabón y otros productos de uso frecuente, como cremas o cosméticos. La intoxicación causada por la ingestión de jabón es bastante frecuente. Aunque la mayoría de los jabones en barra y champús líquidos se consideran relativamente atóxicos, su consumición determina riesgos. Si encuentras a tu hijo con espuma de jabón en la boca o con alguna botella de champú abierta o vacía puede que se haya intoxicado. Mantén la calma y actúa de inmediato. Primero, aleja el envase o los restos de jabón. Si el niño está en edad, haz que escupa. No intentes quitar los restos con tus dedos pues puedes lastimarlo. Conserva los restos del tóxico (incluyendo el envase) o alguna otra evidencia que pueda determinar cuánta cantidad ha ingerido y de qué tipo. A continuación, y mientras llamas al servicio de emergencia, ponte alerta si se presentan los siguientes síntomas: náuseas, vómitos o el indicio de enrojecimiento o irritación local. No hagas vomitar a tu hijo, pues esto puede provocar mayor daño. Aún cuando tu hijo no presente ninguno de los síntomas anteriores, llama al pediatra o al número de emergencia. Debes tener a mano la siguiente información: edad, peso y condición médica de tu hijo; el nombre del producto que i ⿇ y, si se conoce, los componentes y la potencia del mismo (toda esta información está en la etiqueta del envase); la hora en que tomó el jabón o cuándo lo encontraste y la cantidad aproximada; si tu hijo está tomando o tomó algún medicamento, es conveniente que des toda la información que viene en la etiqueta, incluyendo el nombre de la sustancia activa. El médico te indicará si es necesario llevar al niño al centro de salud. Allí, los especialistas tratarán los síntomas de tu hijo. Por lo general, se logra la recuperación. Más información | Medline En Bebés y más | ¿Qué hacer ante una intoxicación? Según el Illinois Poison Center, el jabón puede irritar el estómago o los intestinos si se ingiere. Sin embargo, los jabones para manos y cuerpo son mínimamente tóxicos en cantidades muy pequeñas, como cuando alguien lame o sabe una barra de jabon. Las náuseas y el malestar intestinal son los síntomas más comunes. El New York Times sugiere que los vómitos y la diarrea son los efectos más comunes de la ingesta de jabón. El curso de acción sugerido después de la ingestión de jabón es darle al paciente leche o agua, contactar a una línea directa de control de envenenamientos y monitorear a la persona que ingirió el jabón. Si el paciente va a la sala de emergencias, los médicos controlarán sus signos vitales, incluidos el pulso, la presión arterial y la temperatura, y tratarán cualquier problema que sea necesario. Healthline advierte que los jabones comerciales pueden causar problemas de salud más graves. Algunos detergentes fuertes o jabones pueden causar irritación, quemaduras o incluso pequeños agujeros en la piel. Algunos jabones pueden incluso hacer que la garganta o la lengua se inflamen, lo que puede inhibir la capacidad de respirar y tragar. La intoxicación por jabón puede provocar una caída peligrosa en la presión arterial o un cambio en el pH de la sangre de una persona, cualquiera de los cuales puede dañar los órganos internos del cuerpo. Es irritante para la garganta, para empezar. No sabe bien y comenzará a tratar de escupirlo reflexivamente. No estoy seguro de que te mataría. Si está haciendo esta pregunta como una contemplación de un método de suicidio, busque ayuda.