I'm not a robot

المبادئ التوجيهية لفرفرية نقص الصفيحات المناعية للأطفال 2015

هذا العلاج في المشفى ويستمرّ ليومين وحتّى خمسة أيام. امكانيّة ثالثة هي العلاج بجِبِّ المُسْتَجِبّ (IVIG). هذه الأدوية تدعّم جدار الأوعية الدَّمويّة الصغيرة وهكذا تحدّ من النزيف، تنشّط نقي العظم لانتاج صفائح دمويّة جديدة وتنشّط من وتيرة انتاج المضادّات. يعطى هذا العلاج عبر الفم (أو عبر الوريد ولكن في هذه الحالة يستوجب العلاج مكوثًا في المشفى). ويمكن الاستمرار في تعاطيه لعدّة أسابيع. وهناك علاج آخر هو الغلوبولين (Steroids). علاج: في الفرفريّة فليلة الصّفيحات المجهولة السّبب الحادّة - عندما لا يكون تعداد الصّفائح الدموية منخفضا بشكل خاصّ ولا يلاحظ حدوث نزيف في الأغشية المخاطيّة، من الممكن الاكتفاء بالمتابعة دون علاج. في الحالات الأخرى، من المتعارف عليه العلاج بالستيروئيدات

الأجوبة الأولى من لمصل المناعي لدهون الدم الدهني الدهني الدهني